

Score de syndrome de résection antérieure du rectum (LARS score)^{1,2}

Le but de ce questionnaire est d'évaluer le fonctionnement de votre intestin. Cochez une seule case pour chaque question. Vous pouvez avoir du mal à choisir une réponse car votre état varie d'un jour à l'autre. Dans ce cas, choisissez la réponse qui vous correspond globalement le mieux. Si pour une raison autre votre intestin a été perturbé récemment, n'en tenez pas compte et notez les réponses qui correspondent à votre état habituel.

1. Vous arrive-t-il de ne pas pouvoir contrôler vos flatulences (gaz intestinaux) ?	
☐ Non, jamais	0
☐ Oui, moins d'une fois par semaine	4
☐ Oui, au moins une fois par semaine	7
2. Avez-vous des fuites accidentelles de selles liquides ?	
☐ Non, jamais	0
☐ Oui, moins d'une fois par semaine	3
☐ Oui, au moins une fois par semaine	3
3. A quelle fréquence allez-vous à la selle ?	
☐ Plus de 7 fois par jour	4
☐ 4 à 7 fois par jour	2
☐ 1 à 3 fois par jour	0
☐ Moins d'une fois par jour	5
4. Vous arrive-t-il de retourner à la selle moins d'une heure après y être allé ?	
☐ Non, jamais	0
☐ Oui, moins d'une fois par semaine	9
☐ Oui, au moins une fois par semaine	11
5. Vous arrive-t-il d'avoir une envie très forte au point de vous précipiter pour aller à la selle ?	
☐ Non, jamais	0
☐ Oui, moins d'une fois par semaine	11
☐ Oui, au moins une fois par semaine	16

Ajouter les résultats de chaque question pour obtenir un score final

Résultats:

0-20 : LARS absent

21-29 : LARS mineur

30-42 : LARS majeur

1. Emmertsen KJ, Laurberg S. Low anterior resection syndrome score: development and validation of a symptom-based scoring system for bowel dysfunction after low anterior resection for rectal cancer. Ann Surg. 2012;255:922-928.

2. Juul T, Ahlberg M, Biondo S, et al. International validation of the low anterior resection syndrome score. Ann Surg. 2014;259:728-734.